

# Tratamiento en bacteriemias y endocarditis por *Enterococcus faecalis* mediante tratamiento antibiótico combinado.

marzo 2018

Andrea Domínguez Calvo

Ana Rodríguez Cobo

Medicina Interna

Hospital Universitario HM Sanchinarro

Artículo Original:

[A review of combination antimicrobial therapy for \*Enterococcus faecalis\* bloodstream infections and infective endocarditis.](#)

Autores: Beganovic M, Luther MK, Rice LB, Arias CA, Rybak MJ, LaPlante KL.

Clinical Infectious Diseases 2018;XX(00):1-7

Revisión del tratamiento de la endocarditis infecciosa por *Enterococo faecalis*, valorando la mejor opción terapéutica y sus limitaciones.

Review of the treatment of infectious endocariditis by *Enterococo faecalis*, assessing the best therapeutic option and its limitations

RESUMEN:

El enterococo es responsable de infecciones que producen una importante morbilidad, y una mortalidad de hasta el 20-40%. Estas cifras son similares en los últimos 3 años pese a los avances del tratamiento antimicrobiano. El *Enterococcus faecalis* es el más común y

virulento de las especies, produciendo infecciones serias como la endocarditis. De las endocarditis por enterococo, el 97% son por *Enterococcus faecalis*. Tiene una gran facilidad de formar biofilms y a pesar de ser el más sensible a los antibióticos, las betalactamasas tienen poca actividad bactericida frente a él. Por todo ello, continúa siendo un reto la elección del tratamiento antimicrobiano.

Se realizó una búsqueda en PubMed y Embase de los siguientes ítems: infección, endocarditis, bacteriemia, tratamiento, guías, antibióticos, sinergismo, betalactamasas, biofilms...

Se analizaron las siguientes combinaciones terapéuticas: tratamiento combinado con betalactámicos, aminoglucósidos y betalactámicos entre otros.

#### COMENTARIO:

El enterococo ocupa el tercer lugar entre los microorganismos que producen endocarditis infecciosas, tras los estreptococos y el *Estafilococo aureus*.

Aunque las combinaciones con aminoglucosidos han sido el tratamiento standard para la endocarditis infecciosa enterocócica, el aumento en las resistencias y la disponibilidad de otras opciones menos nefrotóxicas ha llevado a la incorporación de otros tratamientos antimicrobianos. Se ha demostrado en la mayoría de los estudios, que la mejor combinación es Ampicilina y Ceftriaxona tanto para el tratamiento de la endocarditis como para la bacteriemia por *Enterococo*, dado que existe una alta resistencia frente a los aminoglucósidos.